

A

INCONSCIENCIA

1. Definición:

Es la interferencia de las funciones del cerebro.

La gravedad de la condición de la víctima puede probarse por la respuesta a un estímulo, tal como al sonido o al tacto.

Es importante tomar nota de cualquier cambio en la condición del paciente, porque de ello dependerá el tratamiento que eventualmente se le proporcione. La víctima puede mejorar o empeorar.



Si es posible lleve por escrito cualquier variación o conducta de la víctima para entregarla al médico o a la cuadrilla de socorredores. Si hay más mineros presentes ellos llevarán los datos, mientras usted atiende a las víctimas.

2. Niveles de respuesta:

Existen situaciones a través de las cuales la víctima pasa progresivamente del estado consciente al inconsciente y viceversa, cuando:

- El individuo responde normalmente a las preguntas y a la conversación.
- Solamente responde preguntas directas
- Responde vagamente a las preguntas
- Pierde el control
- Solamente responde al dolor
- No responde



3. Tratamiento general:


- a. Asegúrese de que la vía respiratoria esté abierta; retire cualquier elemento extraño de la boca de la víctima y afloje las prendas apretadas.




- b. Si la respiración se vuelve difícil o se detiene, empiece la resucitación inmediatamente.



- c. Examine rápidamente al paciente para determinar la causa de la inconsciencia; busque signos de lesiones en el cráneo o brazaletes, tarjetas, etc. que identifiquen alguna condición médica de la víctima.



- d. Trate las hemorragias severas y fracturas.



- e. Establezca el nivel de respuesta, pulso y respiración. Anote cualquier irregularidad.



- f. Si el paciente está respirando normalmente, colóquelo en posición de recuperación.



Si se sospecha de fractura en la columna vertebral, no mueva a la víctima al menos que se detenga la respiración.

- g. Abriega al paciente y si es posible colóquese una cobija debajo de las rodillas.



- h. Si la víctima no se recupera y el traslado al hospital se demora mucho tiempo, verifique a intervalos de diez (10) minutos el pulso, la respiración y niveles de respuesta.

NO ABANDONE A LA VÍCTIMA

Si la víctima se recupera, recomiéndele ir al médico.