

ANADORPE

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

**VIAJE DE KARSTEN I TRIANA.**

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

Encontrada en las montañas de la Sierra de Anadorpe, en el departamento de Cienfuegos, en el territorio de la provincia de Matanzas.

# NUEVOS GENEROS I ESPECIES DE PLANTAS

PARA

## LA FLORA NEO-GRANADINA.

### ANAMORPHA.

ETIMOLOGIA: *Anamorpha* en griego significa *diversa forma*, alusion al cambio que sufre el cáliz despues de la eflorescencia.

Bittneriaceae.

Monodelphia pentandria.

**Endlicher gen. número 5,339. I.**

*Cáliz* campanudo, hendido en cinco laciniás, al fin entre vejigudo e inflado, laciniás en estivacion valvada.

*Corola* de cinco pétalos en forma de espátula, casi iguales al cáliz, adheridos a la raiz del tubo de los estambres por medio de las uñuelas, en estivacion imbricada.

Cinco *Estambres* hipojinos, opuestos a los pétalos; filamentos reunidos en tubo, sueltos i lineales en el ápice; anteras ovales, dirijidas hacia afuera, de dos hendiduras que se abren longitudinalmente.

*Ovario* muy brevemente estipitado, encerrado en el tubo de los estambres, erizado, de cinco celdillas; dos óvulos en los loculamentos, insertos uno sobre otro en la esquina central, que se enderezan, anátropo; cinco estilos de hechura de hilo, con estigmas como puntos.

*Cápsula* pequeña, casi sentada, escondida dentro del cáliz aumentado, de cinco ventallas.

Una *Semilla* por aborto, que se levanta, aovada, con testa crustácea e hilo basilari; embrión dentro del albúmen carnudo, ortótropo, con cotiledones foliáceos, acorazonados, aproximados, planos; radícula cilíndrica, cercana al hilo, inferior.

*Arbustos* de la Nueva Granada, erizados con vello estrelladito, con hojas alternas, pecioladas, aovadas o entre acorazonadas i aovadas, dentadas o aserradas; dos estípulas laterales, caedizas; inflorescencia de las axilas compuesta de umbelas o umbelillas, con pedúnculo muy

*Calyx* campanulatus, quinquefidus, demum vesiculosus—inflatus, laciniis aestivatione valvatis.

*Corolla* petala quinque, spathulata, calyce subaequantia, unguibus imo tubo stamineo adnata, aestivatione imbricata.

*Stamina* quinque, hypogyna, petalis opposita; filamenta in tubum connata, apice libera, linearia; antherae ovales, extrorsae, longitudinaliter-bimosse dehiscentes.

*Ovarium* brevissimo stipitatum, tubo stamineo inclusum, hirtum, quinqueloculare; ovula in loculis gemina, angulo centrali superposita inserta, adscendentia, anatropa; styli quinque, filiformes, stigmata punctiformia.

*Capsula* minuta, subsessilis, intra calycem auctum recondita, loculicide quinquevalvis.

*Semen* abortu unicum, adscendens, ovatum, testa crustaceo, umbilico basilari; embryo intra albumen carnosum, orthotropus, cotyledonibus foliaceis, cordatis, applicatis, planis, radícula tereti, umbilico proxima, infera.

*Frutices* Novo Granatensis, pube stellulata hirsuti; foliis alternis, petiolatis, ovatis vel subcordato-ovatis, dentatis vel serratis; stipulis lateralibus geminis, desciduis; inflorescentia axillaris; umbellis vel umbellulis, pedunculo simplici vel furcato composita, bracteis bracteolisque

sencillo o ganchudo, sostenidas con brácteas o bracteolillas; cáliz antes de la eflorescencia verde, i cuando lleva fruto, aumentado; corola blanca o amarillenta.

1. *Anamorpha como Melochia*, con hojas pecioladas (pecíolo de media pulgada), aovadas, o entre prolongadas i aovadas, dentadas, pubérrulas; inflorescencia aglomerada en el ápice de un pedúnculo sencillo o bifurcado (de casi dos pulgadas); pétalos blancos marcados de amarillo.

Crece en el valle del Magdalena, entre Tenasucá e Ibagué, a la altura de 300 a 1.300 m. Florece en marzo.

2. *Anamorpha como Walteria*, con hojas de largos pecíolos, aovadas, puntisagudas, acorazonadas en la base, doblemente afestonado aserradas, con la faz superior, los pecíolos i los ramos velludos; i la inferior sedosa con pelos estrelladitos; inflorescencia compuesta de umbellillas aglomeradas, mas cortas que los pecíolos; cápsula velludita.

Crece en el valle del río Cauca a la altura de 1,000 m. cerca de Buga i de la Paila.

fultis; calyce subanthesin viride, fructifer auctus; corolla alba, vel lutescens.

1. *Anamorpha Melochiodes*, foliis petiolatis, petiolo semipollicaris, ovatis vel oblongo-ovatis, dentatis, puberulis; inflorescentia axillaris apice pedunculi simplicis vel bifurcati (subbipollicaris) glomerata; petala alba, flavi punctata.

Crece en convallis fluminis Magdalena inter Tenasucá et Ibagué, alt 300-1,300 m. Floret Martio.

2. *Anamorpha Walteroides*, foliis longe petiolatis, ovatis, acuminatis, basi cordata, duplicatim crenato serratis, pagina superiore sicut petiolis ramisque pilosis; pagina inferiore pilis stellulatis serisea; inflorescentia umbellulis glomeratis composita, petiolo breviori, capsula pilosiuscula.

Crece in convallis fluminis Cauca, alt. 1,000 m. propé Buga et la Paila.

## COMATOGLOSUM.

ETIMOLOGIA: del griego *coma* cabellera, i *glossum* lengua, por las escamas de forma de lengüeta i velludas de la base de la parte interior de los pétalos.

Polygamia.

Endlicher gen número 5,616. I.

**Cáliz** campanudo, partido en cinco-lacinias redondeadas, en estacion recargada.

Cinco a ocho pétalos de la corola hipógynas, prolongados, con uñuelas, mas largos que el cáliz, aumentados hacia adentro, encima de la base con una escama velluda, igualada al limbo reflejado despues de la eflorescencia, erguida despues de la eflorescencia.

**Disco** anular, glanduloso, carnudo, afestonado por las uñuelas de los pétalos, i velludo.

**Calyx** campanulatus, 5 partitus, laciniis rotundatis, ostivatione, imbricata.

**Corollae** petala 5-8 hipogyna, oblonga, unguiculata, calyce longiora, intus supra basim squama limbum subanthesin reflexum sequante, villosa, aucta, subanthesin erecta.

**Discus** annularis, glandulosus, carnosus, ab unguibus petalorum crenatus, villosus.