

sencillo o ganchudo, sostenidas con brácteas o bracteolillas; cáliz antes de la eflorescencia verde, i cuando lleva fruto, aumentado; corola blanca o amarillenta.

1. *Anamorpha como Melochia*, con hojas pecioladas (pecíolo de media pulgada), aovadas, o entre prolongadas i aovadas, dentadas, pubérrulas; inflorescencia aglomerada en el ápice de un pedúnculo sencillo o bifurcado (de casi dos pulgadas); pétalos blancos marcados de amarillo.

Crece en el valle del Magdalena, entre Tenasucá e Ibagué, a la altura de 300 a 1.300 m. Florece en marzo.

2. *Anamorpha como Walteria*, con hojas de largos pecíolos, aovadas, puntisagudas, acorazonadas en la base, doblemente afestonado aserradas, con la faz superior, los pecíolos i los ramos velludos; i la inferior sedosa con pelos estrelladitos; inflorescencia compuesta de umbellillas aglomeradas, mas cortas que los pecíolos; cápsula velludita.

Crece en el valle del río Cauca a la altura de 1,000 m. cerca de Buga i de la Paila.

fultis; calyce subanthesin viride, fructifer auctus; corolla alba, vel lutescens.

1. *Anamorpha Melochiodes*, foliis petiolatis, petiolo semipollicaris, ovatis vel oblongo-ovatis, dentatis, puberulis; inflorescentia axillaris apice pedunculi simplicis vel bifurcati (subbipollicaris) glomerata; petala alba, flavi punctata.

Crece en convallis fluminis Magdalena inter Tenasucá et Ibagué, alt 300-1,300 m. Floret Martio.

2. *Anamorpha Walteroides*, foliis longe petiolatis, ovatis, acuminatis, basi cordatis, duplicatim crenato serratis, pagina superiore sicut petiolis ramisque pilosis; pagina inferiore pilis stellulatis serisea; inflorescentia umbellulis glomeratis composita, petiolo breviori, capsula pilosiuscula.

Crece in convallis fluminis Cauca, alt. 1,000 m. propé Buga et la Paila.

## COMATOGLOSUM.

ETIMOLOGIA: del griego *coma* cabellera, i *glossum* lengua, por las escamas de forma de lengüeta i velludas de la base de la parte interior de los pétalos.

Polygamia.

Endlicher gen número 5,616. I.

**Cáliz** campanudo, partido en cinco-lacinias redondeadas, en estacion recargada.

Cinco a ocho pétalos de la corola hipógina, prolongados, con uñuelas, mas largos que el cáliz, aumentados hacia adentro, encima de la base con una escama velluda, igualada al limbo reflejado despues de la eflorescencia, erguida despues de la eflorescencia.

**Disco** anular, glanduloso, carnudo, afestonado por las uñuelas de los pétalos, i velludo.

**Calyx** campanulatus, 5 partitus, laciniis rotundatis, ostivatione, imbricata.

**Corollae** petala 5-8 hipogyna, oblonga, unguiculata, calyce longiora, intus supra basim squama limbum subanthesin reflexum sequante, villosa, aucta, subanthesin erecta.

**Discus** annularis, glandulosus, carnosus, ab unguibus petalorum crenatus, villosus.

Ocho *Estambres* (mas raras veces 5-7) insertos ácia adentro del disco, filamentos aleznados, velluditos, anteras lineales, agudas, asidas por la base, de dos celdillas, dehiscentes ácia adentro.

*Ovario* pequeñísimo, central, sentado, velludo, de tres celdillas uniovuladas; óvulos prendidos a la base, levantados, anátropos.

*Fruto* trasovado, indehiscente, con pericarpio entre correoso i carnudo, de tres surcos en el ápice, de una celdilla por aborto, con una semilla, o mas raras veces, con dos.

*Semilla* sin albúmen, cotiledones gruesos, aproximados, radícula mui pequeña, inferior.

*Comatogloso apretado.* *Arbusto* casi simple, con hojas alternas, sin estípulas, pinadas sin impar, de 8-10 foliolos casi opuestos, elípticos, de 8 pulgadas de largo, i 2 de ancho, desiguales en la base, mucronados en el ápice, enterísimos, pubescentes por debajo, lisos por encima; inflorescencia terminal, entre cimosa i en panoja, cimas bracteadas; flores polígamas bracteoladas, blancas; fruto del tamaño del huevo de paloma.

*Crece en las márgenes del río Magdalena, a la altura de 350 m., entre Juntas de Apulo i Piedras, en las provincias de Tequendama i Mariquita. Florece en Marzo.*

*Mata-puerco de los naturales.*

*Stamina* ocho (rarius 5-7), disco, intus inserta; filamenta subulata, pilosiuscula; antheræ lineares, acutæ, baxifixæ biloculares, introrse, dehiscentes.

*Ovarium* minimun, centrale, sessile, pilosum, triloculare, loculis uniovulatis; ovulis basi affixis, erectis, anstropis; stigma sessile.

*Fructus* obovatus, indehiscens, pericarpio coriaceo, carnoso, apice trisulcatus, abortu unilocularis, monospermus, rarius dispermus.

*Semen* exalbuminosum, cotyledones crassæ, applicative; radícula minima, infera.

*Comatoglossum strictum.* *Arbustum* rectum, subsimplex; foliis alternis, extipulatis, abrupte pinnatis, foliolis 8-10 suboppositis, ellipticis, 8 pollices longis, 2 pollatis, basi inaequilateris, apice mucronatis, integerrimis, subtus pubescentibus, supra glabris; inflorescentia apicalis, cymoso, paniculata, cymæ bracteata, flores polygami, bracteolatae, albæ; fructus magnitudine ovi columbæ.

*Crescit margines ad fluminis Magdalena, altitudinc 350 m., inter Juntas de Apulo et Piedras, provinciis Tequendama et Mariquita Floret Martio.*

*Mata-puerco incolarum.*

## BROTOBROMA.

ETIMOLOGIA: del griego *brotos* jenitivo de mortal, i *bromos* alimento.

Bettneriaceæ.

Polladellia.

**Endlicher gen num. 5333, 2.**

*Cáliz* ovado, vejigudo, cerrado por todas partes, entre pubérulo i erizado por fuera, finalmente roto en el ápice, despues de la eflorescencia.

Cinco pétalos de la *Corola*, hipoginos, entre acuruchados i cóncavos, cucuruchos doblados ácia adentro en el ápice, i prolongados ácia arriba en una lengüeta lineal, i en estivacion valvada.

*Calyx* ovatus, vesiculosus, undique clausus, extus puberulo-hirtus, tandem subanthesin apice irregulariter rumpens.

*Corollæ* petala quinque, hypogyna, cucullato-concava, cuculli apice inflexo, superne in ligulam linearem producta, æstivatione valvata.