

- Bejuco Carare.** *Aristolochia geminiflora*. HBH. La Mesa y región del Magdalena. Las principales aristoloquias de Colombia están consignadas en la página 121.
- Castro. *Cissus cycloides*. Tierras calientes. Ampelídeas.
 - Chaparro. *Davilia densiflora*. Tr. et Pl. *Tetracera volúbilis*. La Mesa, Villeta, Guaduas, Villavicencio. Dileniáceas.
 - Chirriador. *Cissus cycloides*. L. *C. umbrosa*. HBK. Climas calientes. Del género *cissus* hay en Colombia seis especies conocidas y cinco variedades de la especie enunciada.
 - Clavellino ó zarcillejo. *Mutisia clematis*. D. C. Compuestas. Andes de Bogotá.
 - Conchita. *Clitoria*. Cúcuta. *Papilionácea* de especie indeterminada.
 - de cerca. Véase Amargoso.
 - Guayacán. Véase Amargoso.
 - de granadilla. *Passiflora quadrangularis* ó badea. Pasiflorácea propia de los climas calientes de Colombia.
 - lechoso. *Sarcostemma brownii*. Mey. Magdalena. Asclepiadácea. Pág. 111.
 - de mavure. *Potos flexuosus*. HBH. Río Orinoco. Probablemente entra en la preparación del curare de los indios de aquella región. Véase la pág. 110.
 - de mico. *Schnella Splendens*. Benth. Leguminosa del Chocó (Sandino Groot).
 - de purgación. *Scyphostelma*. H. Bn. S. *granatensis*. H. Bn. Asclepiadácea.
 - quemado. Bejuco tomé. Davilla Kunthii. Ast. Valle del Magdalena. Dileniáceas.
 - de rejo. Provincia de Sumapaz. Puede ser una pasiflorácea, pero no tenemos seguridad.
 - de reuma. *Gouania dominguenis*. L. Llano de San Martín. Rhamnáceas.
 - de salud. Véase Bejuco de cerca.
 - de sangre. *Connarus hæmorrhæus*. Hrst. Departamento del Magdalena.
 - de sapo. *Macrocepis gonolobi*. Kunth. Tocaima. Asclepiadácea. Produce su tallo una fibra textil sedosa y resistente.
 - Tomé. Véase Bejuco quemador.
- Be'acho.** *Helosia guyanensis*. Balanoforácea.
- Beleño.** *Hyosciamus niger*. Solanácea exótica no cultivada en Colombia. Tiene importantes propiedades medicinales.
- Belero** ó Matagente. *Marsdenia*. Cúcuta, Cundinamarca. Asclepiadácea. También se llama Orozús.
- Belladona.** No se ha introducido esta útil planta á Colombia. *Atropa belladona*.
- ó Zarcillo de bruja de Bogotá. Véase Ají del diablo.

- Bella-salvia.** *Salvia leucantha*. Cav. Calosphace. Andes de Colombia.
- Bellísima.** *Antigonum*, *Polygonum tamnifolium*. HBK. En todas las tierras calientes. *A. leptotus* Hook. Planta de Méjico. En Ocaña se llama también Bellísima la *Bougainvillea spectabilis*.
- Bencenuco.** Lombricera, Quebraojo, Rejalgar. *Asclepias curasavica* (Blood. Flower). Cundinamarca, Tolima, Antioquia. Asclepiadácea. V. la pág. 110 para las demás sinonimias vulgares.
— ó Leoncito. *Hamelia suaveolens*. Cundinamarca y Antioquia. Rubiáceas.
- Benjuí** ó Estoraque. *Stirax tomentosum*. Antioquia. San Julián. Ebenáceas. Propiamente el *Estoraque* no es el mismo *Benjuí*, pero goza de iguales propiedades y es muy semejante. El *Estoraque* de la Judea proviene del *Styrax officinalis*. El *Styrax tomentosum* abunda en las selvas seculares de Santander, especialmente en Onzaga, San Joaquín y Mogotes. (Blanco de M.)
- Berengena** ó calabaza de Bogotá. *Cucurbita pepo*. L. Pamplona y demás poblaciones de Santander. Cultivada en los climas fríos. En Antioquia se llama Victoria. El cocimiento del fruto es uno de los mejores contravenenos de la Strichnina. (B. de M.) La berengena de España es una solanácea introducida que se cultiva en Bogotá con el nombre de Pepino morado.
- Berza.** *Brassica olerácea*. D. C. Exótica. Crucífera cultivada.
- Berraco.** Raspador de Ocaña ó Zurrumbo. *Sponia*. *Celtis trinervia*. Lamk. Cundinamarca, Antioquia, Santander. En el Socorro se conoce con el nombre de Látigo. Tr. Celtidea.
- Berros.** *Nasturtium officinalis*. R. Br. Andes de Bogotá. Crucíferas probablemente exóticas.
- Betulia** ó Lirio. *Iris germánica*. Antioquia y Bogotá. Iridacea exótica, hoy subespontánea en muchos lugares de Colombia.
- Bicho.** Brusca ó Chilinchile. *Cassia occidentalis*. L. En el Cauca se llama Yerba de gallinero. Leguminosa. Véase la pág. 34.
- Bihao.** *Calathea*. *Heliconia bihai*. *Scitaminea* del río Magdalena.
- Bijá.** Véase Achote.
- Bijuacá.** Lengua de vaca. *Rumex*. Sabana de Bogotá. Pamplona. Polygonácea. Véase la pág. 123.
- Bilibili** ó Guamo blanco. *Guarea glabra* (1). Vahl. Magdalena. Meliáceas. Arbol grande de buena madera propia para ebanistería. Se llama también guamo simarrón. Pág. 60.
- Birringo.** Pedro Hernández. *Rhus juglandifolia*. Willd. *lindenianum*. *Mauria birringo*. Goudot. Ibagué. Magdalena, Santander. (Véase familia de las Terebintáceas, pág. 49).

(1) In Ann. sc. nat. ser. 5, v. 15, p. 362. Tr. et Pl.

- Bledo** ó Crestas de gallo. *Amaranthus paniculatus* L. *A. atropurpureus*. Plantas de varias especies, conocidas en todo el país y cultivada en los jardines de Bogotá.
- blanco ó espinoso. *Amaranthus blitum*. *A. spinosus*. L. Medellín.
- Bleo** ó Pipichuelo. *Pereskia*. Especie indeterminada de *cactaeas*. Sube. Río Magdalena.
- Boba**. Reciben este nombre varias especies de *Cyateas* y *Dicsonias* arborescentes de los climas fríos de Colombia. Familia de los helechos.
- Boca** de Dragón. *Antirrhinum majus*. Escrofularínea. Exótica y cultivada como planta de adornó.
- de sapo. *Cephalis* HBK. *Tapogomea*. Chocó y Barbacoas. Rubiácea.
- Boldo**. *Pneumus boldus*. Molina. Planta de Chile usada en Terapéutica. Monimiáceas.
- Bonduc** ó Bonduque. *Guilandina bonduc*. *Caesalpinia bonduccella* Flem. Leguminosa de la región ecuatorial de Asia, Africa y América. Contiene una resina llamada bonducina (Bocq. Lim.).
- Boquiabiertos** ó Guargüerones. *Antirrhinum majus*. Exótica y cultivada en las tierras frías. Escrofularíneas.
- Borla** de San Juan. *Lobelia salicifolia*. Antioquia. Campanulácea.
- de San Pedro. *Begonia magnifica*. André. Bogotá.
- Borrachero**. *Brugmansia lutea*. En casi todo el país. Solanácea. Lleva también el nombre vulgar de Floripondio.
- blanco. *Brugmansia candida*. *Datura arbórea*. L. Bogotá, Quindío. Muy común en todo el país. Excelente apósito contra mordedura de culebra. (B. de M.)
- colorado. *Brugmansia*. *Datura sanguinea*. Bogotá. Quindío. Corresponde á la Tonga del Cauca y Tolima. Véase en el *Boletín de Medicina* del Cauca de 1894, número 93, lo relativo á la Tonga.
- Borraja**. *Borrage officinalis*. L. Cultivada en tierras frías. Borragíneas.
- Botón** morado. *Hyptis*. Labiada de especie indeterminada.
- de oro. *Helichrysum staechus*. D C. Compuesta. Cultivada en los jardines.
- de plata. *Helichrysum orientale*. Gaertn. Compuesta. Exótica y cultivada en Colombia como planta ornamental.
- Botoncillo** ó Chisacá. *Spilanthus Mutisii*. Kunth. Bogotá, Cauca. Compuesta. También se conoce con el nombre de Quemadera en Pamplona. Se usa esta planta como dentífrica y en las afecciones del hígado.
- Totesito ó Sánalotodo. *Borreria andina*. Pasto, Cáqueza y Rionegro. Rubiáceas, las raíces son eméticas.

- Bototo.** Carnestolendo, Flechero ó Poroporo. *Cochlospermum hibiscoides*. HBH. San Martín, bajo Magdalena y Panamá. Cochlospérmeas.
- Bore** ó Changue. *Caladium Sculentum*. Colocasia sculenta. Norte de Santander. San Martín. En Chinácota lo llaman Turmero. Es Aroidea de raíces comestibles.
- Brasil.** *Hamatoxylum brasiletto*. Krst. Norte de Colombia. Leguminosa de madera tintoreal y bastante sólida para obras de ingeniería.
- Brasilete.** Véase Brasil.
- Bretónica.** *Salvia gesneriaefolia*. Lindl. Bogotá. Labiadas. Es yerba sudorífica y útil en las dispepsias que proceden de atonía del tubo digestivo.
- Brevas** ó Higos. *Ficus carica*. L. Artocarpeas. Exóticas. Se cultivan en Bogotá y muchos otros lugares del país. El jugo lechoso que mana de su tronco contiene caucho.
- Bryonia.** *Bryonia dioica*. Jaq. Introducida á Bogotá como planta de adorno únicamente. Es vegetal más bien desconocido entre nosotros. La materia médica la estima como importante en el tratamiento de algunas afecciones de las vías respiratorias.
- Bruja** ó Puca. *Rubia nitida*. Pasto y Antioquia. Rubiáceas. Probablemente puede suministrar á la industria un tinte semejante al de la rubia tinctoria.
- Brusca.** Véase Bicho. Leguminosa empleada como café en el Norte de Santander para el tratamiento de las disenterías crónicas.
- Búcaro.** Véase Anaco y Cámbulo.
- Buchón.** *Limnobiium bosci*. L. C. Rich.; L. Spongia. Baillón. Bogotá en las aguas estancadas. Hidrocaridáceas. Las curiosas hojas de este vegetal se mantienen á flote por lo esponjoso de su tejido celular.
- Buenas tardes.** *Oenothera acaulis*. *Oenothera albiflora*. Pamplona. Onzaga, Ubaté. Generalmente crece á 2,400 m. y á 17° del termómetro centígrado. Abre esta planta sus flores de cuatro pétalos blancos al caer de la tarde.
- tardes ó Cortejo. *Vinca rosea*. Cultivada en las tierras calientes. Apocíneas.
- Buirá.** *Petrea volúbilis*. Verbenácea. En La Mesa (Cundinamarca). Se denomina Chaparrito y en Panamá Buirá.
- Burílico.** *Xilopia ligustrifolia*. Dun. Valle del Cauca. Anonáceas. Se emplean sus frutos para alimento de los cerdos.
- Brujitos.** Chochitos de indio ó Pionías. *Abrus precatorius*. Willd. Antioquia. Leguminosas. En Farmacia se llama jequiriti á las semillas de este precioso bejuco. Véase la página 29.