

gudas, adelgazadas en peciolo ácia la base, finamente aserradas, las inferiores lanceoladas, i las superiores ovoides, o entre lanceoladas i ovadas, con pedúnculo casi dos veces mas largo que las hojas superiores.

Crece en los lugares sombríos del Monte del Quindío, a la altura de 2200 m. cerca de la Palmilla. Florece en Febrero.

tiolum attenuatis, argute serratis, inferioribus lanceolatis, superioribus ovatis vel lanceolato-ovatis, pedunculo folio superiore duplo fere longiore.

Crescit in locis umbrosis montis Quinduensis, alt. 2200 m. propè la Palmilla. Floret Februario.

TRICHANTHA.

ETIMOLOGIA: del griego *trichos* pelos i *anthos* flor.

Convolvulaceæ.

Pentandria monogamia.

Endlicher gen n.º 3501. I.

Cáliz de cinco sépalos, casi iguales, redondeados, biseriados, peludos por fuera.

Corola entre campanuda o infundibuliforme, de cinco pliegues, marcada ácia fuera con cinco carreras velludas, verticales.

Cinco *Estambres* insertos en la garganta de la corola, incluidos; filamentos cortos, velludos en la base; anteras rodaderas, de dos hendiduras.

Ovario unilocular, el rudimento del disepimento apenas manifiesto, de cuatro óvulos; estilo cilindrico, bifido en el ápice, estigma en cabezuela.

Cápsula unilocular, de dos ventallas caedizas; los rudimentos filiformes de los disepimentos persistentes a uno i otro lado; cuatro semillas, comprimidas, entre peludas i barbadas en el borde.

Trichantha ferruginea.—Arbusto sarmentoso, con hojas alternas, ovales, acorazonadas en la base, redondeadas en el ápice, mucronadas, alisadas por encima, con los ramos, pubescentes por debajo; inflorescencia axilar, cimosa, mas corta que la hoja; flores de pedúnculos cortos, i corolas blancas cubiertas por fuera en las carreras, con vello ferrugineo, de 4 a 6 líneas de diámetro; frutos ovoides, lisos, de la magnitud de las nueces de avellana.

Crece entre Juntas de Apulo i Piedras, a la altura de 300 a 600 metros, en el valle del rio Magdalena. Florece en diciembre.

Calyx pentaphyllus, sepalis subæqualibus, rotundatis, biseriatis, extus pilosis.

Corolla campanulato-infundibuliformis, 5 plicata, extus areolis villosis quinque, verticalibus notata.

Stamina 5, fauci corollæ inserta, inclusa; filamenta brevis, basi pilosa; antheræ versatile, birimosæ.

Ovarium uniloculare, dissepimenti rudimentum vix manifestum, quadriovulatum; stylus teres, apice bifidus; stigma capitata.

Capsula unilocularis, bivaivis, valvis deciduis, rudimenta dissepimenti filiformia utrinque persistentia; semina 4 compressa, margine piloso-barbata.

Trichantha ferruginea. Frutex scandens, foliis alternis, ovalibus, basi cordatis, apice rotundatis, mucronatis, supra glabratis, subtus ramisque pubescentibus; inflorescencia axillaribus, cymosis, folio brevioribus, floribus brevis pedunculatis, corollis albis, extus areolis pube ferrugineo obsessis, 4-6 pollices diametro, fructibus ovatis, glabris, magnitudine nucis avellanæ.

Crescit in convalli fluminis Magdalena, alt. 300-600 m. (inter Juntas de Apulo, Piedras et el Espinal). Floret Decembri.