

- Uñe** de Cabra. *Acacia farnesiana* Willd. Leguminosa del Norte y Centro de Santander. Pág. 36.
- de gato. *Mertensia aculeata* W. Celtídea del Valle del Magdalena.
 - de gato. *Smilax tomentosa* Goudot, de Ibagué.
 - de gato. *Berberis goudotii* Tr. et Pl. Berberídea de los Andes de Bogotá. Pág. 83.
 - de perro en Cumbitara, en el Cauca. *Xanthoxylum velutinum*; vulg. Tachuelo en otros lugares.
- Upacón** en Bogotá. *Montagnea ovalifolia* D. C. Compuesta.
- Upahuando** de Pasto y Almaguer. *Caenestens umbrosum* (*Lycium umbrosum* Kunth.) Solanácea.
- Urrucay**. *Itica goudotiana* Tr., syn. *Hedwigia rhoifolia*. Benth. Terebintácea del Llano de San Martín.
- Uvas**. *Vitis vinifera*. Ampelídea exótica y cultivada en el país.
- Uva** camarona de los Andes de Bogotá. *Thibaudia macrophylla* HBK. Ericácea.
- de anís. *Psammissia sclerophylla* Pl. et Lind. Ericácea de los Andes de Bogotá. Coronadas en Pamplona.
 - de perro en el Cauca. *Physalis faetens*. Pág. 102.
 - de la Caleta en Panamá, según Grossourdy. *Coccoloba uvifera* L. Poligonáceas.
- Uva-ursi**. Vocablo terapéutico del *Arctostaphylus*. Uva-ursi de la América del Norte. Ericácea.
- Uvita** de agua ó Coralito de Bogotá. *Nertera depressa* (Banks). Gomosisia granatensis Mutis.) Rubiácea. Pág. 202.

V

- Vainilla**. *Vanilla lutescens* Moquin Tand. Se encuentra en Ocaña; y *V. planifolia* Andrew. Cultivada en algunos lugares. Orquídeas. Pág. 130.
- Valdivia** de Antioquia. *Picrolemna valdivia* Planchon. Simarrubea del río Magdalena, confundida de ordinario con el cedrón. Pág. 46.
- Valeriana**. Varias especies de Valerianas de nuestra Flora, que pueden remplazar á la *V. officinalis* L. Pág. 120.
- Vara** de volador. *Spirea argentea*. Rosácea de los Andes de Bogotá.
- Santa. Véase Palo Santo.
- Varejón**. Varejón de caballo ó Pebetera. *Vernonia odoratissima* T. San Martín, Ibagué, Cartago. Compuesta que goza de virtudes medicinales debidas á un glucosido llamado Vernoina. Véase la pág. 116.
- *Cordia*. Especie indeterminada. Río Dagua. Cauca.

- Varejón.** *Vernonia odoratissima* HBK. Compuesta muy eficaz en las insolaciones. Se encuentra en Cumbitara y en el río Magdalena. Varela en Cundinamarca.
- Varela.** Véase Varejón.
- Varilazo** en Panamá. *Cupania laevigata* Miq. Sapindácea, según Seemann.
- Vejigo.** Véase Arbol de seda.
- Velero** en Cartagena. *Croton ferrugineus* HBK. Euforbiáceas. Pág. 54.
- Venadillo** de Cáqueza. *Cassia*. Leguminosas.
- Venturosa.** *Melastera hastata*. Compuesta del Occidente de Cundinamarca.
- *Lantana brasiliensis* Link., *L. moritziana*. Verbenáceas.
- Verbena.** *Verbena valerianoides* y otras especies de toda la República. Se preconizan contra la fiebre amarilla y la tifoidea.
- Verdolaga** en Bogotá. *Portulaca oleracea* L. Especie asiática naturalizada en América. D. C.
- Vermudera** en Panamá. *Poinciana pulcherrima*, según Grossourdy. Leguminosas.
- Verónica** en Bogotá. *Veronica peruviana*. Escrofularínea.
- Verraco.** Arbol de Antioquia, de las Rosáceas?
- Victoria** en Antioquia. *Cucurbita maxima*, Cucurbita pepo L. Cucurbitácea. Lleva el nombre de Calabaza en Bogotá.
- Viditamía** en la Provincia de Tequendama. *Dalechampia canescens* HBK. Euforbiáceas medio urticantes.
- Vidrián** en Antioquia. Tabernaemontana. Apocínea de especie indeterminada.
- Violeta.** *Viola odorata* L. Violácea exótica cultivada en el país. Se usa como pectoral, y su tintura como reactivo químico para reconocer los ácidos y las bases solubles.
- blanca en Bogotá. *Nierembergia spatulata* R. y P. Pequeña solanácea de los Andes. Vive a más de 2,600 metros.
- de los Alpes. *Cyclamen europaeum*. Primulácea exótica y cultivada en Bogotá.
- Vira-vira.** *Achirocline*. Varias especies de los Andes de Bogotá. Compuesta del género *Gnaphalium*.
- Viuda.** Véase Aguiléñas.
- Viva seca** Jacq. *Diphisa carthagenensis*. En el Caño de Loro, cerca de Cartagena.
- Volador** ó Palo de encaje. *Laghetta lintearia* Lam. Dafnáceas. Departamento de Bolívar. (Profesor Sandino Groot)